



i-gel®

i-gel® dispositivo sovraglottideo - Adulto e Pediatrico

Preparazione

Misure adulto




Aprire la confezione di i-gel su di una superficie piana ed estrarre insieme al guscio che lo avvolge.



Rimuovere i-gel dal guscio protettivo e trasferirlo nel palmo della mano, la stessa che tiene il guscio, tenendo i-gel tra pollice ed indice.



Versare una piccola dose di lubrificante a base d'acqua (per es. K-Y Jelly®) sul guscio al centro del manico, nella parte più liscia.



Afferrare i-gel all'altezza del bite-block integrato con la mano opposta libera e cospargere di un sottile strato di lubrificante le parti anteriore, posteriore e laterali della cuffia.



Controllare accuratamente il dispositivo affinché eventuali corpi estranei o eccessi di lubrificante non ostruiscano l'apertura dell'estremità distale. Rimettere i-gel all'interno del guscio protettivo in attesa dell'inserimento.



Misure Pediatriche




Aprire il guscio protettivo e spostare i-gel sul coperchio dello stesso.



Versare una piccola dose di lubrificante a base d'acqua (per es. K-Y Jelly®) sul guscio al centro del manico, nella parte più liscia.



Tecnica di inserimento



Visita il sito www.intersurgical.it/info/gel



Dimensioni paziente	Misura Peso paziente
Neonatale	1 2-5 kg
Infantile	1,5 5-12 kg
Pediatrico, small	2 10-25 kg
Pediatrico, large	2,5 25-35 kg
Adulto, small	3 30-60 kg
Adulto, medium	4 50-90 kg
Adulto, large	5 90+ kg



Note importanti alla tecnica di inserimento raccomandata

A volte può essere percepita una sensazione di "resistenza" prima di raggiungere il punto di posizionamento finale. Questo può essere causato dal passaggio della cuffia del dispositivo attraverso i pilastri palatini. È importante continuare ad inserire i-gel fino ad una resistenza definitiva.

Una volta incontrata questa resistenza definitiva e posizionati i denti incisivi sul bite-block integrato, NON spingere i-gel ulteriormente a fondo e non applicare una forza eccessiva nell'inserimento.

Non è necessario inserire le dita o i pollici dentro la bocca del paziente durante il processo di inserimento del dispositivo.

Questo poster NON costituisce una guida completa a preparazione, inserimento e utilizzo di i-gel. L'utilizzatore deve familiarizzare con le istruzioni per l'uso complete allegate al prodotto, prima di qualsiasi tentativo di utilizzo del dispositivo i-gel. Una User Guide è disponibile contattando Intersurgical o dal sito web www.intersurgical.it/info/gel. Il dispositivo i-gel deve essere sempre separato dal guscio protettivo prima dell'inserimento. Il guscio non è un introduttore e non deve MAI essere inserito nella bocca del paziente. K-Y® è un marchio registrato Johnson and Johnson Inc.

Interagisci con noi

www.intersurgical.it

GELPOSTER issa2_IT_09.17